



GONASYN Gdr[®]

Introducción:

Gonasyngdr[®] es una solución inyectable que contiene Gonadorelina, análogo sintético de la hormona hipotalámica GnRH.

Acción:

La gonadorelina estimula la síntesis y liberación de FSH y LH desde la hipófisis anterior, originando un pico de liberación de gonadotropinas luego de su administración.

Fórmula del producto:

Gonadorelina acetato.....5 mg
Excipientes csp..... 100 ml

Especies de destino:

El producto se indica en Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Conejos y Caninos.

Aplicaciones clínicas:

Bovinos:

- Tratamiento de quistes ováricos foliculares.
- Inducción del estro en vacas en anestro o con ciclos irregulares o prolongados.
- Sincronización de la ovulación en vacas y vaquillonas con celos inducidos por prostaglandinas (Programas OvSynch / CoSynch).
- Aumento de la fertilidad.



Ovinos y Caprinos:

- Inducción de la ovulación.

Equinos:

- Inducción de la ovulación.

Conejos:

- Inducción de la ovulación.
- Aumento del índice de preñez.

Caninos:

- Criptorquidismo.
- Tratamientos de ovarios poliquísticos.

Dosificación:

Bovinos: 2 ml por animal (100 µg por animal).

Ovinos y Caprinos: 2 ml por animal (100 µg por animal).

Equinos: 2 ml por animal (100 µg por animal).

Conejos: 0.2 - 0.4 ml por animal (10-20 µg por animal)

Caninos:

Criptorquidismo: 1 - 2 ml por animal (50 - 100 µg por animal)

Tratamiento de ovarios poliquísticos: 0.06 ml/kg (3.3 µg/kg)

Vías y formas de administración o aplicación:

Este producto se administra por vía inyectable intramuscular, pudiéndose utilizar la vía endovenosa.



Margen de Seguridad:

El producto carece de toxicidad a las dosis recomendadas.
No se han presentado casos de intoxicación aguda a las dosis indicadas.
El criterio establecido internacionalmente considera a estos productos como seguros.

Forma Farmacéutica y presentaciones comerciales:

El producto se presenta en forma de solución inyectable con una concentración de 50 µg/ml en envases de vidrio color ámbar conteniendo 20 y 50 ml. El cierre de los mismos se realiza con tapón de butilo y cápsula de aluminio tipo flip-off. Los mismos se presentan acondicionados en cajas de cartón impresas y prospecto adjunto.

Residuos medicamentosos:

No posee período de restricción pre-ordeño

No posee período de restricción pre-faena

Precauciones generales:

- Debe almacenarse entre 10 y 25 °C y al abrigo de la luz.
- En el transporte, debe mantenerse en lugar fresco, seco y lejos de los rayos solares.
- Por no constituir un riesgo para la salud, no se requieren cuidados especiales en la destrucción del envase.

Período de validez (Vencimiento):

El producto posee dos años de validez.



PRODUCTO PARA EL MANEJO DE LA REPRODUCCION

MANTENER FUERA DEL ACLANCE DE LOS NIÑOS

Elabora y distribuye:



Luis de Sarro 501 – (B1838DQK)

Luis Guillón- Bs. As. – Argentina

Teléfonos/fax: (011) 43676100

E-mail: ventas@syntexar.com

Web: www.syntexar.com